

STIKO-Empfehlungen 2009

Eine Information der Impf-doc-Redaktion (www.impfdoc.de)

Kurz gefasst das Wichtigste:

- Alle Erwachsenen erhalten eine einmalige Pertussis-Impfung als Kombinationsimpfstoff mit Td
- Kinder und Jugendliche erhalten 2 Varizellen Impfungen
- Pneumokokken werden bei Senioren nur einmalig geimpft, Auffrischung nur bei Indikation
- Polio wird im Erwachsenenalter nach der vollständigen Grundimmunisierung einmalig aufgefrischt.

Nähere Erläuterungen:

1.) Auffrischimpfung aP/ap im Erwachsenenalter

Für alle Erwachsenen empfiehlt die STIKO **die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung** zu verabreichen. Bei bestehender Indikation zur Pertussis-Impfung kann ein Tdap-Kombinationsimpfstoff (Boostrix oder Covaxis) verwendet werden, **auch wenn in einem Zeitraum von weniger als 5 Jahren zuvor ein Td-haltiger Impfstoff verimpft** worden ist. - Bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV Kombinationsimpfung (Boostrix-Polio oder Repevax).

Tdap: Die Tdap Empfehlung gilt auch für im Verletzungsfall, falls bis dahin noch keine aP gegeben wurde!!

Erweiterung der Indikation auf den gesamten Gesundheitsdienst und auf Tätigkeit in Gemeinschaftseinrichtungen.

Bisher: Pädiatrie, Schwangerenbetreuung, Geburtshilfe und Gemeinschaftseinrichtungen
Vorschule/Kinderheim

2.) 2 Varizellen-Impfung

Die 2. Dosis Varizellen-Impfstoff sollte im Alter von 15 bis 23 Monaten erfolgen. Der Mindestabstand zwischen zwei Dosen Varizellen- bzw. MMRV-Impfstoff sollte 4 bis 6 Wochen betragen in Abhängigkeit des verwendeten Impfstoffproduktes (bitte Fachinformation beachten).

Ungeimpfte 9-17-jährige erhalten 2 Dosen – damit fällt auch die Varizellen-Impfung unter die Empfehlung „Nachholen bis zum 18. Lebensjahr“

3.) Pneumokokken-Impfung (Pneumovax23):

Als Standardimpfung wird die einmalige Impfung gegen Pneumokokken mit einem Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff bei Personen ≥ 60 Jahren empfohlen.

Wiederholungsimpfungen im Abstand von 5 Jahren sollten nur bei bestimmten Indikationen erfolgen.

Bei folgenden Indikationen sind eine ggf. auch mehrere Wiederholungsimpfungen mit Polysaccharid-Impfstoff im Abstand von 5 (Erwachsene) bzw. mindestens 3 Jahren (Kinder unter 10 Jahren) in Erwägung zu ziehen (Risiko-Nutzen-Abwägung beachten)

Zusätzliche Indikation: Vor Organtransplantation und immunsuppressiver Therapie

4.) Polio – einmalige Auffrischung bei Erwachsenen:

Alle Erwachsenen erhalten einmalig eine Auffrischimpfung als Standardimpfung. Empfehlung: Regelmäßige Auffrischungen (alle 10 Jahre) bei Indikationen bleibt bestehen. Bisherige Regel: Erwachsene erhalten nur eine Grundimmunisierung, Auffrischung nur bei Indikation